

فارج كش هاى تصويب شده از سال ۱۳۸۶ تا پايان مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومي	نام تجارى	درصد	فرمولاسيون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دز مصرف	تاریخ تصويب
۱	آزینو		۰/۱۳	L	جاويد شیمی فارس	جاروک	ليموترش		۴ در هزار	۱۴۰۳/۶/۲۶
۲	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /ليتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/ليتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	۴۲ روز	۰/۵ ليتر در هکتار	۹۲/۳/۲۷
۳	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /ليتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/ليتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	زنگ زرد	گندم	۴۲ روز	۰/۵ ليتر در هکتار	۹۷/۶/۲۷
۴	اپوکسی کونازول ۱۸۷ گرم /ليتر+تیوفانات متیل ۳۱۰ گرم/ليتر	رکس دو	۴۹/۷٪	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چغندر قند	-	۰/۵ ليتر در هکتار	۹۷/۷/۱۶
۵	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/ليتر+ ديفنو کونازول ۱۲۵ گرم/ليتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه.گلخانه	خیار: ۲ روز	مزرعه: ۱ ليتر در هکتار	۸۸/۹/۳۰
								۲ روز	گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	
۶	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/ليتر+ ديفنو کونازول ۱۲۵ گرم/ليتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه برگی سرکوسپورایی	چغندر قند	-	۱ ليتر در هکتار	۹۹/۱۰/۲۲
۷	آزوکسی استروبین ۲۰۰ گرم/ليتر+ ديفنو کونازول ۱۲۵ گرم/ليتر	ارتیواتاپ	۳۲/۵٪	SC	سینجنتا	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۳۰۰ میلی ليتر در هکتار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۸	آزوکسی استروبین+ ديفنو کونازول	سفیر	۳۲/۵٪	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶

۹۷/۷/۱۶	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	-	خيار گلخانه	سفیدک پودری	کاوش کیمیاى کرمان	SC	۳۲/۵%	دیفوروبین	آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	۹
۹۲/۸/۲۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	زنگ زرد	سینجتا	SC	۲۸%	آمیستاراکسترا	آزوکسی استروبین + سیپروکونازول	۱۰
۱۴۰۱/۱۱/۳	یک لیتر در هکتار		گندم	سپتوریای برگ	سینجتا	SC	۲۵%	بیکانتا	آزوکسی استروبین ۱۲۵g/l + دیفنو کونازول ۱۲۵ g/l	۱۱
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰/۷ در هزار در مرحله جوانه زنی شاخه ها و با فاصله ۱۴ روز از سمپاشی اول با دز ۱/۲ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک سطحی	بایرا گ	CS	۳۰%	پروسپر	اسپیروکسامین	۱۲
۹۲/۸/۲۷	۰/۶ لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	زنگ زرد	بایرا گ	EC	۴۶%	فالکن	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	۱۳
۹۴/۳/۲۵	۰/۸-۰/۷ لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	فوزاریوم سنبله	بایرا گ	EC	۴۶%	فالکن	اسپیروکسامین + تبو کونازول + تریادیمنول	۱۴
۱۴۰۰/۶/۲۰	۳/۵ در هزار	۳-۷ روز	خيار	سفیدک کرکی	پرتونار ویمال هند	SC	۳۵%	اکسی کلرورپرتونار	اکسی کلرور مس	۱۵
۱۴۰۰/۶/۱	۳/۵ در هزار	۳-۷ روز	خيار	سفیدک کرکی	کاوش کیمیاى کرمان شیام کمیکالز	SC	۳۵%	کیمیا کوپر اکسی	اکسی کلرور مس	۱۶
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۰۰ گرم در لیتر		مرکبات	گموز فایتوفترایی طوقه پوسیدگی ریشه	بصیر شیمی پارس ایزاگرو ایتالیا	WP	۵۰%	فلیت	اکسی کلرور مس	۱۷

۹۴/۶/۲۳	۳ کیلو گرم در هکتار	۵ روز	خیار	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده اگریا	WP	۴۳/۹۵%	کوپروسیت سی	اکسی کلرور مس + سیمو کسانیل	۱۸
۱۴۰۰/۹/۲۹	گلخانه ۶: در هزار	۳ روز	خیار	سفیدک کرکی	سینجنتا	WG	۱۶/۱۹%	ریدومیل گلد آر	اکسی کلرور مس + مفنوکسام (متالاکسیل ام)	۱۹
	فضای باز: ۶ کیلوگرم در هکتار (دوبار سمپاشی در فصل زراعی به فاصله ۱۴ روز)									
۹۹/۱۱/۶	۲ در هزار	-	گردو	آنتراکنوز	رها اندیش کاوان	WG	۴۵%	ردشیلد	اکسید مس	۲۰
۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵%	نوردوکس	اکسید مس	۲۱
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	۱۵ روز	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵%	نوردوکس	اکسید مس	۲۲
۹۴/۷/۶	۱ کیلوگرم در هکتار	۱۵ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵%	نوردوکس	اکسید مس	۲۳
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی <i>Pseudomonas syringae</i>	رها اندیش کاوان Nordox	WG	۴۵%	رد شیلد	اکسید مس	۲۴
۹۶/۴/۱۹	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	برنج	پوسیدگی طوقه و ریشه	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	۷۵%	نوردوکس	اکسید مس	۲۵
۱۴۰۰/۹/۲۹	۱/۵ لیتر در هکتار (خزانة)	-	توتون	سفیدک داخلی	Zhejiang Heben Pesticides and chemical	SC	۳۱/۸%	نوردوکسیل	اکسید مس (نوردوکس) ۲۵/۸%+متالاکسیل ۶%	۲۶
	۲ لیتر در هکتار (مزرعه)									

۱۴۰۰/۹/۱۵	۴ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	برزرگر برجسته Agro life Science corporation	WP	۸۵٪	کوپراکسی کلرید مس برزرگر	اکسی کلرور مس(دارای ۳/۵۸٪ مس)	۲۷
۱۴۰۰/۴/۱۴	۲ در هزار	۳ روز	گوجه فرنگی	سفیدک کرکی	آرمان سبز آدینه شیام کمیکالز	WP	۵۰٪	کوپر پلاس	اکسی کلرور مس	۲۸
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۷ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۱ روز	خیار (فضای باز و گلخانه)	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	SC	۵۲/۵٪	اوروگو	آمتوکترا دین + دیمتومورف	۲۹
۹۹/۲/۸	۰/۷ در هزار در فواصل زمانی ۷-۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۱ روز	هندوانه	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	SC	۵۲/۵٪	اوروگو	آمتوکترا دین + دیمتومورف	۳۰
۹۹/۴/۳۰	۱ در هزار، در فواصل زمانی ۷- ۱۰ روز جهت کنترل بیماری	۱ روز	انگور	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	SC	۵۳/۵٪	اوروگو	آمتوکترا دین + دیمتومورف	۳۱
۱۴۰۲/۴/۱۹	۴۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری به صورت ضد عفونی		سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی و شوره سیاه	بایر	FS	۵٪	امستوپرایم	پنفلوفن	۳۲
۹۸/۱۱/۲۸	یک در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش ها و حداکثر دوبار درسال	-	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	SC	۳۰٪	میلیس	پیری متانیل	۳۳

۱۴۰۳/۳/۲۱	دو در هزار	-	مرکبات	کپک سبز	دانش میوه خاورمیانه	EC		زداتان ۲۰	پریمتانیل ۱۸۷/۲ گرم/لیتر + روغن میخک ۱۸۵ گرم/لیتر	۳۴
					Xeda					
۱۴۰۳/۳/۲۱	۲ لیتر به ازای هر ۱۰۰۰ کیلو میوه	-	مرکبات	کپک سبز	دانش میوه خاورمیانه	واکس آماده مصرف		مکسی فرش	پریمتانیل ۰/۱۴٪ + صمغ گیاهی کارنوبا ۱۹٪	۳۵
					پریمتانیل تولید شرکت xeda فرانسه					
۸۶/۱۰/۱۰	۲٪ وزن غده	-	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	۵۰٪	رورال	ایپرودیون	۳۶
۹۹/۴/۳۰	۴ لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری	-	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	پاک سم ایرانیان jiangsu Lanfeng	SC	۲۶٪	رست آپ	ایپرودیون ۱۷۵ + کاربندازیم ۸۵ (گرم /لیتر)	۳۷
۹۶/۳/۱	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	برنج	بلاست	مشکفام فارس نیپون نوهیاکو	EC	۴۰٪	فوجی وان	ایزوپروتیولان	۳۸
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۳۹
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۴۰
۹۵/۸/۲۴	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	انگور	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	۴۰٪	بلکیوت	ایمینو کتادین تریس	۴۱

۹۷/۲/۲۴	۱۸۰ گرم در هکتار	۲ روز	برنج	بلاست	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۴۲
۱۴۰۱/۴/۲۰	۱/۲۵ در هزار	-	گوجه فرنگی	لکه موجی آلترناریایی	گیاه پرنیان اطلس Deqiang Biology	WP	۵٪	کانگ می	باسیلوس سوبتیلیس	۴۳
۹۸/۸/۲۷	در سه مرحله به ترتیب با دزهای ۵، ۴ و ۵ لیتر در هکتار	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریوم	رویون تيسان	SC	۱۰ ^۸	پارس باسیل	باسیلوس ولزنسیس	۴۴
۹۸/۱۰/۹	۵ در هزار	ندارد	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	بایرآلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۴۵
۱۴۰۰/۹/۲۲	۱۰ لیتر در هکتار به روش خیساندن خاک پس از انتقال نشاء	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	بایرآلمان	SC	۱۰ ^{۱۲}	سرناد	باسیلوس سوبتیلیس <i>Bacillus subtilis</i>	۴۶
۹۹/۴/۳۰	۲۰۰ گرم در هکتار، ۴۵ و ۹۰ روز پس از کاشت	ندارد	چغندر قند	پوسیدگی ریزوکتونایی ریشه	زیست فناوری سبز	پودر مرطوب	۱۰ ^۷	روبین ۱	باسیلوس سوبتیلیس	۴۷
۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پردیس	SC	۱۸٪	میشو بردوکس	مخلوط بردو	۴۸
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۷ روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاوش کیمیا کرمان	SC	۱۸٪	بردو کیمیا	مخلوط بردو	۴۹

۹۶/۱۱/۱۶	۱۰ در هزار	۷ روز	زردآلو	غربالی	البرز بهسم	SC	۱۸٪	بردو بهسم	مخلوط بردو ماده موثره سولفات مس و هیدروکسید کلسیم	۵۰
۹۶/۲/۲۵	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵۰ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۱۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	۱۸٪	بردوسیف	مخلوط بردو	۵۱
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	سبزآور نگین فلات	SC	۱۸٪	بردوسیف	مخلوط بردو	۵۲
۹۸/۳/۲۷	۸ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	سبزآور نگین فلات	SC	۱۸٪	بردوسیف	مخلوط بردو	۵۳
۹۶/۳/۱	۵-۸ در هزار در زمان ریزش برگ-ها در پاییز و تورم جوانه-ها در بهار	۷ روز	هلو	پیچیدگی برگ	سمیران	SC	۲۰٪	بردو سمیران	مخلوط بردو	۵۴
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	اکسین شیمی آدان	SC	۲۰٪	بردوکسین	مخلوط بردو	۵۵
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	مخلوط بردو	۵۶
۹۸/۳/۲۷	۹ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	۲۰٪	بردوتکس	مخلوط بردو	۵۷
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۵۸
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مرحله ۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۵۹
۹۸/۳/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	باغبان تاک	SC	۸۰٪	سولفیکس	مخلوط بردو	۶۰

۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۱
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	باغبان تاک	SC	۱۸٪	بردوفیکس	مخلوط بردو	۶۲
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردالو	غربالی	گیاه	SC	۲۰٪	بردوجی	مخلوط بردو	۶۳
۹۹/۴/۳۰	۱۵ در هزار	-	زردالو	غربالی	فراورده های طیف سبز	SC	۱۸٪	بردوطیف	مخلوط بردو	۶۴
۱۴۰۰/۹/۱۵	۵ لیتر در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	SC	۱۰٪	MANIFLOW	مخلوط بردو	۶۵
۱۴۰۳/۶/۲۶	۶ در هزار	-	درختان میوه هسته دار	شانکر باکتریایی	گیاه	WP	۲۴٪		مخلوط بردو	۶۶
۹۹/۶/۲۴	۳ کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش های ثبت شده	۷ روز	خیار	سفیدک کرکی	خزرسم کود مانیکا ایتالیا	WP	۳۳٪	توتور	مخلوط بردو ۱۵٪(CU) + فوزتیل آلومینیوم ۱۸٪	۶۷
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار(حداکثر دو بار در سال)	-	گوجه فرنگی	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس Shandong Kangqiao	WG	۳۸٪	یونیلیس	بوسکالید + پیراکلواستروبین	۶۸
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	۳۸٪	بلیس	بوسکالید + پیراکلواستروبین	۶۹

۹۷/۱۲/۱۳	۰/۷ در هزار و در تناوب با سایر قارچکش-ها و حداکثر دوبار درسال	-	سیب درختی	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	۳۸٪	بلیس	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۷۰
۹۴/۱۲/۱۰	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۷۱
۹۵/۳/۱۷	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۷۲
۹۸/۱۱/۲۸	۱/۵ در هزار و در تناوب با سایر قارچ-کش-ها و حداکثر دوبار درسال	۳ روز	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	۳۴/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۷۳
۹۹/۳/۱۲	۱/۵ کیلو گرم در هکتار حداکثر دو مرحله و با رعایت فاصله ۱۴	۳ روز	کاهو	افتادگی برگ	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۷۴
۱۴۰۰/۷/۲۶	۱/۲۵ در هزار	۳ روز	خیار	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلواستروبین	۷۵
۱۴۰۳/۴/۱۱	۱۲۰۰ گرم در هکتار	۳ روز	سیب	سوختگی استمفیلیومی برگ	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	۷۶
۱۴۰۳/۷/۱۶	۱ در هزار	۳ روز	لفل گلخانه ای	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	۳۳/۴٪	سیگنوم	بوسکالید ۲۶۷ گرم/کیلوگرم+ پیراکلواستروبین ۶۷ گرم/کیلوگرم	۷۷
۸۹/۹/۲۹	۰/۵ در هزار	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۷۸
۹۶/۹/۱۳	۰/۴ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۷۹
۹۸/۴/۱۰	۰/۵ در هزار	-	گوجه فرنگی (فضای باز)	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۸۰
۹۰/۱۲/۱	۵ در هزار	-	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیا سبز آور	SP	۸۵٪	کالیبان	بی کربنات پتاسیم	۸۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰/۷ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	۸۲
۱۴۰۲/۵/۳۰	۰/۸ در هزار	-	سیب	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	۲۰٪	میراویس دیوو	پایدیفلومتوفن ۷۵ (آدپیدین) گرم/کیلوگرم+دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/کیلوگرم	۸۳
۱۴۰۳/۵/۱	دو در هزار		گندم	سیاهک پنهان (ضد عفونی بذور)	پاک گستر پرند	SL	۲۰٪	فورمایسین گلد پی ایکس	پراستیک اسید+پراکسید هیدروژن	۸۴
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهاور شیمی آستک	EC	۲۵٪	بهتیل	پروپیکونازول	۸۵
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱	گندم	سپتور یوز	گیاه پر نیان اطلس Safa tarim	EC	۳۰٪	هاربور	پروپیکونازول ۱۵ درصد+ دیفنو کونازول ۱۵ درصد	۸۶
۸۹/۳/۱۰	۱۰-۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول+ تبو کونازول	۸۷
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی-لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	بایر آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول+ تبو کونازول	۸۸
۹۶/۴/۱۹	۱۵ میلی-لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	FS	۴۰٪	لاماردور	پروتیو کونازول+ تبو کونازول	۸۹

۱۴۰۳/۲/۳	نیم در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آگ	FS	۱۷٪	ردیگو پرو	پروتیو کونازول گرم/لیتر +۱۵۰ تبوکونازول ۲۰ گرم /لیتر	۹۰
۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خیار	بوته میری	بایر آگ	SL	۸۴٪	پرویکورانترژی	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	۹۱
۹۲/۸/۷	۲ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	۶۸/۷۵٪	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	۹۲
۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	۶۸/۷۵٪	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	۹۳
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بازرگان کالا Arysta life science	SC	۴۵٪	پروکسانیل	پروپامو کاب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۹۴
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲ در هزار ۲ لیتر در هکتار در فضای باز	۳-۷ روز	خیار	سفیدک داخلی	دلتا پارس نهاده آگریا	SC	۴۵٪	ریوالدو	پروپامو کاب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۹۵

۹۶/۱۱/۳۰	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دو هفته پس از انتقال نشا	-	خیار	بوته میری <i>Pythiumaph nidermatum</i>	بازرگان کالا Arysta life science	SL	۷۲/۲٪	پروپلنت	پروپامو کارب هیدروکلراید	۹۶
۹۷/۱۲/۱۳	نیم لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	۳۵/۵٪	اینور	پروپیکونازول+فلوکساپیروکساد+پیراک لواستروبین	۹۷
۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	۵۰٪	آکورد	پروکلراز	۹۸
۹۹/۴/۳۰	۱-۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	-	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی	بایرا گ	FS	۲۵٪	مونسرن	پنسیکرون	۹۹
۱۴۰۳/۳/۲۱	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	برنج	بلاست	BASF	CS	۱۰٪	سلتیما	پیراکلواستروبین	۱۰۰
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۳۵ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	DF	۱۸/۷٪	پیرادیم	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	۱۰۱
۱۴۰۱/۴/۲۰	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	سوختگی الترناریایی	برزگر برجسته Jiangsu Greenscie Chemical	DF	۱۸/۷٪	پیرادیم	پیراکلواستروبین + دیمتومورف	۱۰۲
۹۹/۳/۱۲	۱/۵ لیتر در هکتار	-	گندم	سفیدک پودری	ب آ اس اف	EC	۲۲/۵٪	پریاکسور	پیراکلواستروبین + فلوکساپیروکساد	۱۰۳

۱۴۰۰/۹/۱۵	۰/۳-۰/۴ در هزار در طول فصل رویش همراه با آب آبیاری دوبار در فصل کاشت	-	خيار گلخانه	عامل پیشگیرانه بیماری گیاهچه میری	بازارگان کالا Biopreparaly	WP		پلی ورسوم	<i>Pythium Oligandrum</i> Drechsler	۱۰۴
۹۷/۲/۳۰	۶۰ کیلوگرم برای بذرمال کردن ۴ تن غده سیب زمینی در هکتار	ندارد	سیب زمینی	پژمردگی ورتیسیلیومی	بهاران دشت ساحل	ذرات جامد قابل انتشار در آب	۱۰ ^۹	تالارومین	تالارومیسس فلاووس	۱۰۵
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتینیایی	بایر آگ	EW	۲۵٪	فولیکور	تبوکونازول	۱۰۶
۹۵/۹/۲۹	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بیستر فیلد	FS	۶٪	آرتمیس	تبوکونازول	۱۰۷
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گل سم گرگان نینگ بوسانجوی	EW	۲۵٪	تبوکور	تبوکونازول	۱۰۸
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴ لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	گیاه پرنیان اطلس تاید کراپ-ساینس	SC	۴۰٪	تایدتیبو	تبوکونازول	۱۰۹
۸۹/۱۰/۱۳	۱۰۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر ۳۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار سیاهک پنهان	ایزاگرو	LS	۱۲/۵٪	لوسپل	تتراکونازول	۱۱۰
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار	-	رز	سفیدک پودری	آریاشیمی Ningbo + Sunjoy Jiangsu	SC	۳۲٪	آذیلون	تبوکونازول + آزوکسی استروبین	۱۱۱

۱۴۰۱/۴/۲۰	۰/۶ در هزار	-	هلو	سفیدک پودری	بازرگان کالا Isagro	SC	۱۸٪	آفیانس	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	۱۱۲
۱۴۰۲/۳/۲۹	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	لکه موجی	بازرگان کالا Isagro	SC	۱۸٪	آفیانس	تتراکونازول+آزوکسی استروبین	۱۱۳
۱۴۰۰/۹/۱	۶ دهم لیتر در هکتار	-	گندم	سفیدک پودری	ساعی گل تهران Jiangsu Mindleader crop science	SC	۳۰٪ (۳۴۵گرم/لیتر)	پیلارتاب	تبوکونازول + پیراکلواستروبین	۱۱۴
۸۸/۸/۱۱	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه ۰/۴ در هزار در گلخانه	۳ روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	۱۰٪	دومارک	تتراکونازول	۱۱۵
۹۲/۳/۲۷	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	۱۰٪	دومارک	تتراکونازول	۱۱۶
۹۰/۷/۴	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	۱۲/۵٪	امی ننت	تتراکونازول	۱۱۷
۸۹/۳/۱۰	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	DS	۷/۵٪	بایتان	تریادیمنول	۱۱۸
۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	۲۰٪	رنال	تری تیکونازول	۱۱۹
۸۸/۸/۱۱	۲۰۰ گرم در هکتار	۱ روز	جالیز- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۵۰٪	فلینت	تری فلوکسی استروبین	۱۲۰
۹۶/۵/۲	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۵۰٪	فلینت	تری فلوکسی استروبین	۱۲۱

۱۴۰۳/۵/۲۲	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	ناردان توسعه یزد	SC	۵۶٪		تری فلوکسی استروبین +۱۴٪ بوسکالید ۴۲٪	۱۲۲
۹۲/۳/۶	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۳
۹۴/۵/۱۲	۰/۳-۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۴
۹۵/۶/۱	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۵
۹۵/۶/۱	۲۰۰ گرم در هکتار	-	چغندر قند	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۶
۹۶/۹/۱۳	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	شیت بلایت	بایر آگ	WG	۷۵٪	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۷
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	بازرگانان سرای سپند پارس CAC Nantong	WG	۷۵٪	فلونازول	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۷
۹۸/۱۱/۱۴	۳۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان &sunjoy CAC Nanton	SC	۳۷/۵٪	تیلما	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۱۲۸
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	گل سم گرگان &sunjoy CAC Nanton	WG	۷۵٪	ایوت	تری فلوکسی استروبین +۵۰٪ تبوکونازول ۲۵٪	۱۲۹
۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلویپرام	۱۳۰

۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلویپرام	۱۳۱
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلویپرام	۱۳۲
۹۶/۵/۲	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلویپرام	۱۳۳
۱۴۰۰/۷/۲۶	۴ دهم در هزار	-	خیار	کپک خاکستری	بایر آگ	SC	۵۰٪	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلویپرام	۱۳۴
۹۹/۱۰/۹	یک در هزار	-	درختان سیب	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان نپون سودا	EC	۱۵٪	تریفمین	تری فلومیزول	۱۳۵
۹۹/۱۰/۱	۷۵ / ۰ در هزار	۱۴ روز	هلو	سفیدک پودری	رهااندیش کاوان نپون سودا	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	۱۳۶
۱۴۰۰/۴/۱۴	۷۵ / ۰ در هزار	۱۵ روز	هلو	مومیایی	رهااندیش کاوان نپون سودا	WG	۱۸/۴٪	پانچو تی اف	تری فلومیزول + سایفلوفنامید	۱۳۷
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۳ در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	۱۹٪	ساپرول	تریفورین	۱۳۸
۹۸/۱۲/۲۸	۰/۴- ۰/۵ در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	ب آ اس اف	FS	۱۲٪	اینشورپرفرم	تریتیکونازول + پیراکلواستروبین	۱۳۹
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	-	گندم	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	۱۲٪	اینشورپرفرم	تریتیکونازول + پیراکلواستروبین	۱۴۰

۹۹/۳/۲۶	۳۰۰ سی سی در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها	۲۱ روز	برنج	سوختگی غلاف برگ برنج(شیت بلایت)	گروه شهر سبز و سلامت پارسیان Shandong kangqiao	SC	۲۴٪	آچمز	تیفلوزامید	۱۴۱
۹۰/۳/۳۰	۰/۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	۷۲/۵٪	ویستا	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	۱۴۲
۹۱/۲/۹	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	WP	۱۰ ^۹	تریانوم پی	تریکودرماهارزیانوم	۱۴۳
۹۱/۲/۹	۳۰-۴۰ گرم برای هزار گیاه	ندارد	خیار گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	WP	۱۰ ^۹	تریانوم پی	تریکودرماهارزیانوم	۱۴۴
۹۷/۹/۲۱	۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	ندارد	طالبی	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	G	۱۰ ^۹	تریانوم جی	تریکودرماهارزیانوم	۱۴۵
۹۷/۹/۲۱	۲۵۰-۳۷۵ گرم در متر مکعب	ندارد	گوجه فرنگی گلخانه	پژمردگی فوزاریومی	گیاه کوپرت هلند	G	۱۰ ^۸	تریانوم جی	تریکودرماهارزیانوم	۱۴۶
۱۴۰۳/۳/۲۱	۵ کیلوگرم در هکتار	ندارد	سویا	پوسیدگی زغالی	پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای	WP	۱۰ ^۸	-	سه جدایه موتانت تریکودرما	۱۴۷
۱۴۰۲/۵/۳۰	۰/۷۵ در هزار	۴۵ روز	سیب	لکه سیاه	ب آ اس اف	SC	۵۰٪	دلان	دیتیانون	۱۴۸
۸۹/۳/۱۰	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	سینجتتا	FS	۳/۶۳٪	دیویدند استار	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	۱۴۹

۱۵۰	دیفنو کونازول + سایپرو کونازول	دیویدند استار	۳/۶۳%	FS	سینجتتا	سیاهک آشکار	گندم	-	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	۸۹/۹/۱
۱۵۱	دیفنو کونازول + سیفلوفنامید	سیدلی تاپ	۱۴%	DC	سینجتتا	سفیدک پودری	خیار در شرایط گلخانه‌ای	-	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	۹۷/۸/۱۴
۱۵۲	دیفنو کونازول ۱۲۵ گرم/لیتر + سیفلوفنامید ۱۵ گرم/لیتر	سیدلی تاپ	۱۴%	DC	سینجتتا	سوختگی استمفیلیومی برگ	سیب	۱۵ روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار با فاصله ۷-۱۰ روز به صورت متناوب	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۵۳	دیفنو کونازول + فلوکسپایروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	خیار گلخانه‌ای	۳ روز	۰/۵ در هزار	۹۹/۱۰/۲۲
۱۵۴	دیفنو کونازول + فلوکسپایروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	سیب	۳ روز	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۹/۲۲
۱۵۵	دیفنو کونازول + فلوکسپایروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه سیاه سیب	سیب	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۰/۱۲/۹
۱۵۶	دیفنو کونازول + فلوکسپایروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	سیب زمینی	۷ روز	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۱/۷/۲۵
۱۵۷	دیفنو کونازول + فلوکسپایروکساد (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	لکه موجی	گوجه فرنگی	۳ روز	۱۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۵۸	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسپایروکساد ۷۵ گرم/لیتر (xemium)	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	توت فرنگی	-	۰/۶ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۵۹	دیفنو کونازول ۵۰ گرم/لیتر + فلوکسپایروکساد ۷۵ گرم/لیتر	داگونیس	۱۲/۵%	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	گوجه فرنگی	۳ روز	۶۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۳/۴/۱۱
۱۶۰	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	کابریو دو	۱۱/۲%	EC	ب آ اس اف	آلترناریا	گوجه فرنگی	۳ روز	۲ لیتر در هکتار	۹۴/۱۲/۱۰
۱۶۱	دیمتومورف + مانکوزب	آکروبات ام زد	۶۹%	WG	ب آ اس اف	سفیدک داخلی	سیب زمینی	۷ روز	۲ کیلوگرم در هکتار	۹۴/۸/۲۵

۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتنیایی	سینجنتا	SC	۴۲٪	آلتو کمی	سایپروکونازول + کاربندازیم	۱۶۲
۹۱/۳/۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	۴۰٪	رانمن	سیازوفامید	۱۶۳
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	بادزدگی	ایشیهارا	SC	۴۰٪	رانمن	سیازوفامید	۱۶۴
۹۶/۵/۲	۱/۵ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	۱۰٪	رانمن	سیازوفامید	۱۶۵
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۶ در هزار (بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار (گلخانه)	سفیدک داخلی	بازرگانان سرای سپند پارس شانوگ هایلر	SC	۲۰٪	رگنانت	سیازوفامید	۱۶۶
۹۲/۴/۱۷	۳ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	بیستر فیلد	WG	۸۰٪	سولفولاک	سولفور	۱۶۷
۹۲/۸/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سمیران	SC	۸۰٪	گوگرد سمیران	سولفور	۱۶۸
۹۳/۶/۱۰	۳/۷۵ در هزار	۲۰ روز	شلیل	سفیدک پودری	ارکیده سازان	SC	۴۰٪	سولفور ارکیده سازان	سولفور	۱۶۹
۹۹/۳/۲۶	۳ در هزار با مشاهده اولین علائم و در تناوب با سایر قارچ کش ها	-	خیار گلخانه	سفیدک پودری	آریا شیمی کروماندل	DF	۸۰٪	پارومی دی	سوافور	۱۷۰

۱۴۰۱/۱۱/۳	۱ در هزار	۱۴ روز	انگور	پوسیدگی خاکستری	آتیه نگین فلات Shaanxi hengrun chemical industry	WG	۵۰٪	سیپرودین	سیپرودینیل	۱۷۱
۱۴۰۲/۵/۹	۱ در هزار	۳ روز	گوچه فرنگی	نکروز ساقه	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	۱۷۲
۱۴۰۲/۵/۹	۰/۸ در هزار	۳ روز	توت فرنگی	کپک خاکستری	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل+فلودیوکسانیل	۱۷۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱ در هزار	۷ روز	خیار	کپک خاکستری	سینجنتا	WG	۶۲/۵٪	سویچ	سیپرودینیل ۳۷.۵٪+فلودیوکسانیل ۲۵٪	۱۷۴
۹۸/۱۰/۹	۳ در هزار	-	توت فرنگی	کپک خاکستری	رهروان رویش سبز	SP	۶۲/۲٪	سراکوئینت	سولفات مس ۱۰۲+ فسفیت پتاسیم ۵۱۹	۱۷۵
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۴ کیلوگرم در هکتار (مزرعه)	-	پیاز	سفیدک داخلی	خزر سم کود Zhejiang Sega	WG	۵۲/۵٪	اکولایزر	فاموکسادون+ سیموکسانیل	۱۷۶
۹۹/۶/۲۴	۴۰۰ گرم در هکتار	۱۴ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	زرین خوشه جنوب Shanghai Shengnong	WG	۵۲/۵٪	زرین پرو	فاموکسادون+ سیموکسانیل	۱۷۷
۹۹/۴/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	سفیدک پودری	الیت ساوان OAT AGRO	EC	۵٪	گاتن	فلوتیانیل	۱۷۸

۹۷/۱۰/۱۷	۳ لیتر در هکتار(در تناوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوزاریوم	کیمیا سبزینه پویا جیانگ سو	SC	۲۵٪	لیانگدی	فناماکریل	۱۷۹
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم غده بذری		سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی <i>Rhizoctonia solani</i>	سینجتنا	FS	۱۰٪	سلسنت	فلودیکسانیل	۱۸۰
۱۴۰۰/۴/۲۸	۰/۱۵ در هزار	۲۱ روز	هلو	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	سرکادیس	فلوکسایپروکساد	۱۸۱
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۱۵ در هزار	۲۱ روز	انگور	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	سرکادیس	فلوکسایپروکساد	۱۸۲
۹۲/۱۲/۵	۲/۵ در هزار	۳۰ روز	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	۸۰٪	الیت	فوزتیل آلومینیوم	۱۸۳
۹۶/۵/۲	۲ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	گموز	دوگال	WP	۸۰٪	رودر	فوزتیل آلومینیوم	۱۸۴
۹۹/۱۰/۲۲	۲/۵ در هزار	۱۴ روز	پسته	انگومک	گل سم گرگان LiminChemical	WP	۸۰٪	فیتوکیور	فوزتیل آلومینیوم	۱۸۵
۹۵/۸/۲۴	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۷ روز	انگور	سفیدک داخلی	بایر آگ	WG	۷۱/۱٪	پروفایلر	فوزتیل آلومینیوم+ فلویپیکولید	۱۸۶
۱۴۰۳/۷/۱۶	۱۵ در هزار		گوجه فرنگی	پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه	زیست کنترل نانو مقیاس	نانوامولسیون		نانوپگان	عصاره گیاه اسپند ۱۳٪ (هارمین)	۱۸۷

۸۷/۵/۲	۰/۲ در هزار	۴ روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	۵۰٪	استروبی	کروزکسیم متیل	۱۸۸
۹۸/۴/۱۰	۰/۵ در هزار (نوبت اول بلافاصله پس از کاشت و نوبت دوم بین مرحله ۲-۳ برگی همراه با آب آبیاری)	-	خیار (گلخانه و فضای باز)	بوته میری Phytophthora melonis	سبا کوشا کشت پروبلت فیتو اسپانیا	SL	۳۷/۵٪	بلتانول	کینوسول (سولفات ۸- هیدروکسی کیتولین)	۱۸۹
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۷ در هزار (استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از ۴ نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۱ روز	خیار(گلخانه)	سفیدک داخلی	سینجنتا	SC	۵۰٪	کاریال استار	ماندی پروپامید+ دیفنو کونازول	۱۹۰
۱۴۰۲/۳/۲۹	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار در مناطق مرطوب کناره های دریای خزر و سواحل خلیج فارس	۳ روز	گوجه فرنگی	لکه موجی- سفیدک داخلی	سینجنتا	SC	۵۰٪	کاریال استار	ماندی پروپامید+ دیفنو کونازول	۱۹۱
۹۷/۹/۲۶	۰/۳ در هزار (به صورت تناوبی با قارچ-کش-های دیگر)	-	سیب درختی	لکه سیاه	سبزمحصول داتیس ناگارجونا اگری کم	WP	۴۰٪	آتیس	مایکلوبوتانیل	۱۹۲
۸۶/۸/۲۸	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	-	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوشه	پد کاغذی	۷ گرم متا بی سولفیت	سولفور پد	متا بی سولفیت سدیم	۱۹۳
۹۶/۴/۱۹	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	۷۲٪	داونی جی	متالاکسیل + مانکوزب	۱۹۴

۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۹۵
۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بهاور شیمی	WP	۷۲٪	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۱۹۶
۹۹/۳/۱۲	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	کیمیا گوهر خاک Leeds	WP	۷۲٪	منکوماکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۹۷
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خیار گلخانه	بوته میری	ایرمان UPL	WP	۷۲٪	منکولاکسیل	متالاکسیل ۸ درصد + مانکوزب ۶۴ درصد	۱۹۸
۹۹/۴/۹	۲/۵ در هزار	-	گوجه فرنگی	سفیدک داخلی	پیراکشت شیمی Industrias Quimicas Valles	SC	۲۲٪	آر متیل آر	متالاکسیل ۳/۵ درصد + هیدروکسید مس ۱۸/۵ درصد	۱۹۹

۱۴۰۰/۶/۱	۱ در هزار		ذرت	فوزاریوم	سینجنتا	FS	۳/۵%	ماکسیم ایکس ال	متالاکسیل ام (مفنوکسام) ۱۰ گرم/لیتر+فلودایوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	۲۰۰
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خیار	بوته میری	اکسیر کشاورزی یزد Zhejiang Heben	GR	۵%	ریدومکس	متالاکسیل	۲۰۱
۹۹/۹/۱۷	۲ در هزار	-	خیار	بوته میری	گیاه Zhejiang Heben	GR	۵%	ردوکسیل	متالاکسیل	۲۰۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲ گرم در متر مربع (گلخانه) به صورت گرانول پاشی	-	خیار	بوته میری <i>Pythium aphaniderm atum</i>	گیاه	GR	۵%	ردوکسیل	متالاکسیل	۲۰۳
۹۸/۴/۱۰	۱/۵ لیتر در هزار	-	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	سینجنتا	SE	۴۴/۶%	یونیفورم	مفنوکسام ۱۲/۴٪+ آزوکسی استروبین ۳۲/۲٪	۲۰۴
۱۴۰۱/۹/۱	۳/۵ لیتر در هکتار در مناطق با آلودگی زیاد	۱۴ روز	پیاز	پوسیدگی فوزاریومی ریشه	گیاه پرنیان اطلس Safa Tarim	SC	۳/۵%	مالوین ایکس ال اف اس ۰۳۵	متالاکسیل ام ۱۰ گرم/لیتر+فلودایوکسانیل ۲۵ گرم/لیتر	۲۰۵
۱۴۰۲/۵/۳۰	یک در هزار	۲۱ روز	انگور	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۷/۵%	رویونا	مفن تری فلوکونازول	۲۰۶

۹۵/۶/۲۹	۳-۴ در هزار	صفر روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	JI Biotech	SL	۵۳٪	فسفایت	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	۲۰۷
۱۴۰۰/۹/۲۹	۲/۵ در هزار	-	پسته	پوسیدگی فایتوفترایی ریشه و طوقه	بصیر شیمی Agrichem	SL	۶۰٪	اگریفوس	نمک های مونو و دی پتاسیم اسید فسفونیک	۲۰۸
۹۵/۱۰/۲۷	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۱۰ روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	۳۰٪	تاچی گارن	های مکسازول	۲۰۹
۱۴۰۰/۹/۱۵	۱/۲ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	بازارگان کالا ISAGRO	WG	۲۸٪	BADGE	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	۲۱۰
۱۴۰۱/۵/۱۰	۲/۵ کیلوگرم در هکتار	سه روز	گوجه فرنگی	سفیدک کرکی	بازارگان کالا ISAGRO	WG	۲۸٪	BADGE	هیدروکسید مس + اکسی کلرور مس	۲۱۱
۹۶/۸/۲۹	مزرعه: ۱۰ در هزار گلخانه: ۷/۵ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۸۳٪	میلدی کیور	عصاره سیر ، روغن پنبه دانه، روغن ذرت	۲۱۲
۹۸/۱۰/۹	۴ در هزار	ندارد	توت فرنگی	کپک خاکستری	روماک گستر غرب	EC	۶۰٪	روماک	اسانس روغن بنه	۲۱۳